

Benexol

B₁ - B₆ - B₁₂

comprimidos recubiertos con película

**Antineurítico, desintoxicante,
cardiotónico y roborante.**



Composición

Cada comprimido recubierto con película contiene, como sustancias activas, 250 mg de hidrocloreto de tiamina (DCI) (=vitamina B₁), 250 mg de hidrocloreto de piridoxina (DCI) (=vitamina B₆), y 1000 microgramos de cianocobalamina (DCI) (=vitamina B₁₂).

Excipientes: Manitol, sílice coloidal anhidra, povidona, estearato de magnesio, almidón de patata pregelatinizado, copolímero ácido metacrílico y acrilato de etilo (1:1), dispersión al 30 %, carmelosa sódica, macrogol 6000, talco, triacetato de glicerol.

Propiedades

Estas vitaminas como factores de coenzimas, cumplen funciones muy importantes en el metabolismo intermediario. La tiamina y la piridoxina tienen también un papel fisiológico como antineuríticas y desintoxicantes y una acción complementaria cardiotónica. La cianocobalamina es tónica en general y provoca un aumento del apetito.

La tiamina es esencial en el recambio de los carbohidratos; es indispensable para el mantenimiento del adecuado consumo del oxígeno cerebral e impide la acumulación nociva de los ácidos láctico y pirúvico. La piridoxina regula el metabolismo de los aminoácidos y ejerce una acción farmacodinámica propia en los trastornos del sistema extrapiramidal. Esta acción reguladora del metabolismo, es de capital importancia para los procesos de desintoxicación de sustancias exógenas o endógenas.

Ambas vitaminas son indispensables para el funcionamiento normal del corazón, siendo útil su administración como coadyuvante al tratamiento de los trastornos cardíacos funcionales.

La cianocobalamina es de acción anabólica y antálgica constituyendo un factor indispensable para el crecimiento de todos los seres vivos. Está relacionada con el metabolismo de los glúcidos y prótidos y muy estrechamente con la hematopoyesis.

Indicaciones

Estados tóxicos y degenerativos del tejido nervioso (neuritis y polineuritis: de origen carencial, metabólico o tóxico). Trastornos neurológicos de la diabetes y de la gestación. Temblor idiopático y senil, parkinsonismo, corea menor, encefalopatías, psicosis alcohólicas crónicas, delirium tremens.

Intoxicaciones diversas (vómitos gravídicos y postoperatorios, efectos de radiaciones, etilismo, venenos industriales). Complicaciones cerebrales y cardíacas de la intoxicación etílica.

Trastornos funcionales cardíacos (insuficiencia cardíaca, extrasístoles, taquicardia, alteraciones de la inervación cardíaca, disnea de esfuerzo, hipotensión por inedia, casos refractarios a los tratamientos estándar). Esfuerzos excesivos en los deportes. Astenias convalecencias, surmenage físico e intelectual, y en general siempre que se desee una mejoría rápida del estado general.

Posología

Preventiva: 1-2 comprimidos recubiertos con película al día.

Terapéutica: 2-4 comprimidos recubiertos con película o más al día.

Normas de administración

No masticar ni disolver los comprimidos; tómesese con un poco de agua.

Contraindicaciones

No tiene, a no ser en casos rarísimos, la sensibilidad a la tiamina (vitamina B₁).

Efectos secundarios

No se han descrito.

Incompatibilidades

Los pacientes tratados con levodopa no deben recibir simultáneamente piridoxina (vitamina B₆) a dosis netamente superiores a los normales requerimientos cotidianos.

Intoxicación y su tratamiento

No presenta intoxicación a pesar de una sobredosificación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

Conservación

Protéjase el envase del calor.

Presentación

Comprimidos recubiertos de película. Envase de 30.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

Sin receta médica.

Importante para la mujer

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

TITULAR
QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A.
Pau Claris, 196
08037 Barcelona

FABRICANTE
ROCHE. S.P.A.
Vía Morelli, 2
I-20090 Segrate, Milan. Italia

