

811620.1-EFP I

Protovit



Polivitaminico

Gotas 15 mL Via oral

Protovit®



Polivitamínico

Propiedades

PROTOVIT es un POLIVITAMÍNICO que contiene vitaminas necesarias para el correcto desarrollo del organismo.

PROTOVIT suministra cantidades suficientes de vitaminas fundamentales que el organismo necesita para prevenir o resolver aquellas situaciones en las que los requerimientos diarios de estos principios indispensables para el organismo no están atendidos o pudieran no estarlo por diferentes motivos.

PROTOVIT, por su presentación en gotas, se administra fácilmente tanto en NIÑOS como en ADULTOS con dificultades en la deglución.

Composición

PROTOVIT se presenta en forma de solución acuosa (gotas) con la siguiente composición:

	por ml (24 gotas)
Retinol (DCI) (Vit. A)	3.000 U.I.
Tiamina (DCI) (Vit. B ₁)	2,0 mg
Riboflavina (DCI) (Vit. B ₂)	1,5 mg
Nicotinamida (DCI) (Vit. PP)	15,0 mg
Piridoxina (DCI) (Vit. B ₆)	2,0 mg
Dexpantenol (DCI)	10,0 mg
Biotina (DCI) (Vit. H)	0,2 mg
Acido ascórbico (DCI) (Vit. C)	80,0 mg
Ergocalciferol (DCI) (Vit. D)	900 U.I.
Acetato DL- α -tocoferilo (DCI) (Vit. E)	15,0 mg
Glicerol	486,5 mg
Propilenglicol	220,0 mg
Aceite de castor polioxil 40 hidrogenado	50,0 mg

p-hidroxibenzoato de metilo, p-hidroxibenzoato de propilo, sacarina sódica, aroma de naranja D, aroma de lima deterpenada, aroma de plátano 50.213/A y agua.

Indicaciones

Prevención de estados carenciales de vitaminas, siempre que exista la necesidad de un aporte vitamínico por encontrarse disminuidas las reservas de estos elementos en situaciones como por ej.: dietas desequilibradas, inapetencia, convalecencias.

Posología y normas de administración

PROTOVIT, por su forma de administración en gotas, se puede administrar directamente sobre la lengua o diluir en papillas, leche, zumos, agua u otros alimentos.

NIÑOS hasta los 6 años: 6 gotas 1 vez al día.

NIÑOS de 7-14 años: 10 gotas 1 vez al día.

ADULTOS: 10 gotas 1 vez al día.

Se puede modificar la dosis, siempre que la situación lo requiera, bajo prescripción del médico.

Observación

Para utilizar el frasco cuentagotas, éste debe mantenerse en posición vertical, con la boca hacia abajo. Si la solución no saliese enseguida, agítese el frasco ligeramente, golpéese con la mano suavemente o inviertase varias veces consecutivas.

Contraindicaciones

Alergia a alguno de sus componentes. Hipercalcemia. Insuficiencia hepática o renal grave. Enfermedad de Leber. En condiciones normales no necesitan administrarse, durante el embarazo, dosis superiores a los 100 mg de vitamina C al día. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

Incompatibilidades

Con antiácidos que contengan magnesio, espaciar la toma al menos dos horas. Con tratamientos antiparkinsonianos a base de L-Dopa.

Interacciones

La vitamina C en dosis altas, puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

Precauciones

No debe tomarse de forma continuada. En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

No deben tomarse dosis altas de vitamina C en el embarazo (Ver apartado de CONTRAINDICACIONES).

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

Efectos secundarios

Las dosis superiores a 1 g de vitamina C por día (12,5 ml de Protovit) pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales. Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos. Posibilidad de reacciones alérgicas a alguno de sus componentes.

Advertencias

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Este medicamento por contener aceite de castor polioxil 40 hidrogenado como excipiente, puede producir náuseas, vómitos, cólico y, a altas dosis, purgación severa. No administrar en caso de obstrucción intestinal.

Intoxicación y su tratamiento

Por sobredosisificación o ingestión accidental de grandes cantidades se podrían producir alteraciones digestivas (náuseas, vómitos, diarreas), dolores de cabeza o de articulaciones y nerviosismo. Consultar al médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Conservación

Conservar en lugar fresco.

Presentación

Gotas. Envase de 15 ml.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.A.
Pau Claris, 196
08037 Barcelona

Fabricado por:
Roche S. p. A.
Via Morelli, 2
I-20090 Segrate (Milano)

Bayer

905284-8211
010605-8