



C/. Aranjuez, Nave 612 - Pol. Ind. ALCALA I
28805 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tels.: 91 882 42 86 - 91 882 45 73
Fax: 91 879 60 24
e-mail: diseño@graficaszurita.com
www.graficaszurita.com



LABORATORIO	ALCALA FARMA, S.A.		
PRODUCTO:	SALDEVA Forte		
CODIGO:	551413	IDENTIFIC.:	SF/F
ANULA AL	SF/E	LAETUS N.º	199
PAPEL:	offset blanco	GRAMAJE:	60 gr
PANTONES:	3005 C	DIMENSIONES:	105x148 mm
PLEGADO:	2 perpendiculares al texto (26,25x148 mm)		
TIPOGRAFIA:	IMAGEN		

Anverso:

Conforme Laboratorio:

Saldeva *forte*
Comprimidos



La menstruación o regla es un proceso fisiológico que puede cursar con los siguientes síntomas: dolores abdominales, lumbares y de cabeza (cefaleas), náuseas, alteraciones del estado de ánimo y retención de agua.

La fórmula de **Saldeva** *forte* está diseñada para aliviar las molestias y dolores que puedan presentarse antes o durante la regla.

COMPOSICION CUANTITATIVA

Cada comprimido contiene: paracetamol (D.C.I.), 500 mg; cafeína anhidra, 50 mg; dimenhidrinato (D.C.I.), 15 mg.

Croscarmelosa sódica, metilcelulosa, celulosa microcristalina, talco, estearato de magnesio, povidona, colorante violeta al agua y colorante uva tinta al agua.

INDICACIONES

Saldeva *forte* es un tratamiento sintomático para los dolores y molestias que preceden o acompañan a la menstruación o regla.

POSOLOGIA

Mayores de 14 años: iniciar el tratamiento con 1 ó 2 comprimidos. Seguir con 1 comprimido cada 4 ó 6 horas mientras los dolores y molestias persistan.

No se excederá de 8 comprimidos en 24 horas.

Para jóvenes entre 12 y 14 años, la dosis será de 1 comprimido por toma 4 ó 5 veces al día.

La administración de **Saldeva** *forte* está supeditada a la aparición de dolores y molestias de la regla. A medida que éstas desaparezcan debe suspenderse esta medicación.

CONTRAINDICACIONES

Enfermedades hepáticas. Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIONES

En pacientes con insuficiencia hepática y/o renal, anemia, asma, glaucoma, afecciones cardíacas o pulmonares, evitar tratamientos prolongados. La cafeína puede elevar los niveles de glucosa (azúcar) en sangre: precaución en diabéticos.

No administrar junto con alcohol u otros depresores del Sistema Nervioso Central ya que, por contener dimenhidrinato, puede aumentarse el riesgo de somnolencia. No administrar a niñas menores de 12 años sin consultar al médico. Como la regla es un proceso contrario al embarazo, este medicamento no está indicado en mujeres embarazadas. Si usted está embarazada o cree estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

PRUEBA N.º 1

Fecha: 03/06/09



C/. Aranjuez, Nave 612 - Pol. Ind. ALCALA I
28805 ALCALA DE HENARES (Madrid)
Tels.: 91 882 42 86 - 91 882 45 73
Fax: 91 879 60 24
e-mail: diseño@graficaszurita.com
www.graficaszurita.com



LABORATORIO	ALCALA FARMA, S.A.		
PRODUCTO:	SALDEVA Forte		
CODIGO:	551413	IDENTIFIC.:	SF/F
ANULA AL	SF/E	LAETUS N.º	199
PAPEL:	offset blanco	GRAMAJE:	60 gr
PANTONES:	3005 C	DIMENSIONES:	105x148 mm
PLEGADO:	2 perpendiculares al texto (26,25x148 mm)		
TIPOGRAFIA:	IMAGEN		

Reverso:

Conforme Laboratorio:

EFECTOS SECUNDARIOS

Hepatotoxicidad con dosis altas o tratamientos prolongados. Raramente pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones sanguíneas.

INTERACCIONES

Puede aumentar la toxicidad del cloranfenicol. Consulte a su médico o farmacéutico si está en tratamiento con antihistamínicos o con medicamentos que actúen sobre el Sistema Nervioso Central.

INTOXICACION Y TRATAMIENTO

La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia y dolor abdominal. Si se ha ingerido una sobredosis debe acudir rápidamente a un Centro Médico aunque no haya síntomas, ya que éstos, muy graves, se manifiestan generalmente a partir del tercer día después de su ingestión.

Se considera sobredosis de paracetamol, la ingestión de una sola toma de más de 6 g en adultos (más de 12 comprimidos en una sola dosis) y más de 100 mg por kg de peso en jóvenes. Pacientes en tratamiento con barbitúricos o alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de paracetamol.

El tratamiento consiste en aspiración y lavado gástrico, carbón activado vía oral, administración intravenosa de N-acetilcisteína a dosis adecuadas y, si es preciso, hemodiálisis.

El período en que el tratamiento ofrece la mayor garantía de eficacia se encuentra dentro de las 12 horas siguientes a la ingestión de la sobredosis.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562.04.20.

ADVERTENCIAS

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de Control del dopaje como positivo.

PRESENTACION

Estuche de 10 comprimidos.
Conservar por debajo de 25°C.

Titular:
QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Fabricado por:
Laboratorios Alcalá Farma S.L.
Ctra. M-300, km 29,920
28802 Alcalá de Henares (MADRID)

Bayer

SIN RECETA MEDICA. LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

SF/F

PRUEBA N.º 1

Fecha: 03/06/09