

# Redoxon



## Comprimidos masticables 500 mg Vitamina C (Ácido ascórbico)

### COMPOSICIÓN

Cada comprimido masticable de Redoxon contiene 500 mg de vitamina C (=ácido ascórbico) (DCI).

Excipientes: Sorbitol, manitol (E-421), talco, estearato de magnesio, aspartamo (E-951), óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, aroma de naranja.

### PROPIEDADES GENERALES

El organismo humano necesita diariamente la Vitamina C (ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

### INDICACIONES

Prevención de estados carenciales de vitamina C.

Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo, en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales y estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Como norma general se tomará un comprimido una o dos veces diarias, preferiblemente por la mañana o a primeras horas de la tarde (hasta el anochecer).

### CONTRAINDICACIONES

En condiciones normales no necesitan administrarse, en el embarazo, dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

### EFFECTOS SECUNDARIOS

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

## INTERACCIONES

La vitamina C en dosis altas, puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol, o anticonceptivos hormonales.

## PRECAUCIONES

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

## ADVERTENCIA

### **Advertencia sobre excipientes**

Este medicamento contiene sorbitol. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

Este medicamento puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria porque contiene aspartamo que es una fuente de fenilalanina.

## CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25° C. Mantener el frasco perfectamente cerrado.

## SOBREDOSIS

En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda al médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

## PRESENTACIÓN

Envase con 30 comprimidos masticables de 500 mg.

### **Otras presentaciones de Redoxon:**

Envase con 15 comprimidos efervescentes de 1 g con sabor a naranja (Redoxon 1.000 mg Comprimidos Efervescentes Sabor Naranja).

Envase con 20 ml de solución gotas (1 ml = 200 mg)

Envase con 2 tubos de 15 comprimidos efervescentes de 1 g con sabor a naranja (Redoxon 1.000 mg Comprimidos Efervescente Sabor Naranja).

Envase con 2 tubos de 15 comprimidos efervescentes de 1 g con sabor a limón (Redoxon 1.000 mg Comprimidos Efervescente Sabor Limón).

### **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.  
Sin receta médica.**

### **TITULAR**

QUIMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.  
Av. Baix Llobregat, 3-5  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

### **FABRICANTE**

Bayer Santé Familiale  
33 rue de l'Industrie  
74240 Gaillard  
Francia

# Redoxon<sup>®</sup>



## **1.000 mg Efervescente**

### **Sabor Naranja**

#### **Vitamina C (ácido ascórbico)**

#### **Composición**

Cada comprimido de Redoxon 1.000 mg Efervescente Sabor Naranja contiene: 1.000 mg de vitamina C (= ácido ascórbico) (DCI), Bicarbonato sódico, Acido cítrico anhidro, Carbonato sódico anhidro, Acido málico, Isomaltosa, Cloruro sódico, Acesulfamo potásico, Aspartamo, Aroma de naranja Ultraseal 97363-51 Givaudan, Aroma de mandarina Permaseal 84279-B Givaudan, Beta - caroteno 1% CWS.

#### **Propiedades generales**

El organismo humano necesita diariamente la vitamina C (ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

#### **Indicaciones**

Prevención de estados carenciales de vitamina C.

Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales y estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

#### **Dosis y modo de empleo**

Como norma general se tomará un comprimido una vez al día, preferentemente por la mañana o a primera hora de la tarde (hasta el anochecer).

Déjese disolver el comprimido efervescente en un vaso de agua y se obtendrá una bebida de agradable sabor a naranja. Nunca se tomará el comprimido directamente, sin disolverlo.

#### **Contraindicaciones**

En condiciones normales no necesita administrarse, en el embarazo, dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

#### **Efectos secundarios**

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

## Interacciones

La vitamina C en dosis, puede modificar la acción de ciertos medicamentos.

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

## Precauciones

No deben tomarse dosis altas en el embarazo (Ver apartado de CONTRAINDICACIONES).

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

## Advertencia

Las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas pueden dar resultados erróneos.

## Advertencia sobre excipientes

Este medicamento por contener 312 mg de sodio por comprimido efervescente puede ser perjudicial en pacientes con dietas pobres en sodio.

Este medicamento contiene como excipiente Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada comprimido efervescente del mismo contiene 11,2 mg de fenilalanina.

## Conservación

Conservar el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco.

## Sobredosis

En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda al médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

## Presentación

Envase con un tubo de 15 comprimidos efervescentes, de 1.000 mg con sabor a naranja.

Envase con dos tubos de 15 comprimidos efervescentes, de 1.000 mg con sabor a naranja.

## Otras presentaciones de Redoxon:

Envase con 20 comprimidos masticables de 500 mg

Envase con 20 ml de solución gotas (1 ml = 200 mg)

Envase con un tubo de 15 comprimidos efervescentes de 1.000 mg con sabor a limón.

Envase con dos tubos de 15 comprimidos efervescentes de 1.000 mg con sabor a limón.

### Importante para la mujer

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**

**Sin receta médica.**

### Titular

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.

Av. Baix Llobregat, 3 - 5

08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

### Fabricante

Bayer Santé Familiale

33 rue de l'Industrie

F-74240 Gaillard (Francia)



Bayer

# Redoxon



**Gotas**

## Vitamina C (ácido ascórbico)

### Composición

Cada ml de solución gotas al 20% de Redoxon contiene 200 mg de vitamina C (= ácido ascórbico) (DCI), sacarina sódica; metil parahidroxibenzoato, propil parahidroxibenzoato, glicerol, hidróxido sódico, aroma de caramelo 12.25.4124, esencia de ciruela claudia, aroma de naranja D, concentrado de caramelo y agua desmineralizada. Un ml corresponde aproximadamente a 20 gotas, es decir que una gota contiene, aproximadamente, 10 mg de vitamina C.

### Propiedades generales

El organismo humano necesita diariamente la Vitamina C (Acido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

### Indicaciones

Prevención de estados carenciales de vitamina C.

Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo, en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, embarazo, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales y estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

### Dosis y modo de empleo

Como norma general se tomarán 5 a 20 gotas (según edad del niño), una o dos veces diarias, preferiblemente por la mañana o primeras horas de la tarde (hasta el anochecer). Los adultos, que eventualmente prefieran esta forma a los comprimidos masticables, tomarán 20-50 gotas, una o dos veces al día.

Las gotas podrán tomarse con agua, jugos de frutas, alimentos, bebidas refrescantes, etc., según preferencias.

Uso del frasco cuentagotas: el dispositivo del que va provisto el frasco facilita la dosificación adecuada. Póngase el frasco verticalmente con la abertura hacia abajo. Si la solución no gotea enseguida, agítese o golpéese ligeramente el frasco con la mano o inviértase varias veces.

### Contraindicaciones

En condiciones normales no necesitan administrarse, en el embarazo, dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

### **Efectos secundarios**

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

### **Interacciones**

La vitamina C en dosis altas, puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol, o anti-conceptivos hormonales.

### **Precauciones**

No deben tomarse dosis altas en el embarazo (Ver apartado de CONTRAINDICACIONES).

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

### **Advertencia**

Si está utilizando este medicamento, las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas pueden dar resultados erróneos, lo que deberá ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

### **Advertencia sobre excipientes**

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

### **Conservación**

Conserve el frasco bien cerrado y en posición vertical, protegido del calor.

### **Sobredosis**

En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda al médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

### **Presentación**

Envase con 20 ml de solución gotas (1ml=200mg).

Otras presentaciones de Redoxon:

Envase con 20 comprimidos masticables de 500 mg.

Envase con 15 comprimidos efervescentes, de 1 g con sabor a naranja (Redoxon 1000 mg Efervescente Sabor Naranja).

Envase con 15 comprimidos efervescentes, de 1 g con sabor a limón (Redoxon 1000 mg Efervescente Sabor Limón).

### **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Sin receta médica.**

#### **Titular**

QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.L.  
Av. Baix Llobregat, 3 - 5  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

#### **Fabricante**

ROCHE, S.p.A.  
Via Morelli, 2  
I-20090 Segrate, Milán (Italia)

**Bayer**

# Redoxon<sup>®</sup>



## **1.000 mg Comprimidos Efervescentes Sabor Limón**

**Acido ascórbico (DCI)**

### **Composición**

Cada comprimido de Redoxon 1.000 mg Efervescente Sabor Limón contiene:

Acido ascórbico (DCI) (Vitamina C), ..... 1.000 mg

Excipientes: Bicarbonato sódico, Acido cítrico anhidro, Carbonato sódico anhidro, Acido málico, Isomaltosa, Cloruro Sódico, Acesulfamo potásico, Aspartamo, Aroma de limón Ultraseal 97592-71 Giavudan, Aceite vegetal absorbible 7675<sup>o</sup>-71 Giavudan, Riboflavina.

### **Forma farmacéutica**

Comprimidos efervescentes. Envase con un tubo de 15 comprimidos y envase con dos tubos de 15 comprimidos.

### **Actividad**

El organismo humano necesita diariamente la vitamina C (ácido ascórbico) a todas las edades. Esta vitamina es de gran importancia puesto que interviene en numerosos procesos del organismo, particularmente en relación con la formación de colágeno, la proteína que constituye la membrana basal de los capilares, las fibras del tejido conjuntivo y la matriz orgánica de los tejidos duros, como el hueso y el diente.

### **Titular y Fabricante**

#### **Titular**

QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.L.  
Av. Baix Llobregat, 3 - 5  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

#### **Fabricante**

Bayer Santé Familiale  
33 rue de l'Industrie  
F-74240 Gaillard (Francia)

### **Indicaciones**

Prevención de estados carenciales de vitamina C.

Aunque la dieta habitual es rica en ácido ascórbico y cubre las necesidades de esta vitamina, sin embargo en algunos casos como úlcera péptica, hipertiroidismo, diarrea crónica, tabaquismo, uso de anticonceptivos hormonales, estados de malnutrición que no pueden corregirse con la dieta (ej. pacientes bajo regímenes dietéticos), puede ser necesario un mayor aporte de vitamina C.

### **Contraindicaciones**

En condiciones normales no necesita administrarse, en el embarazo, dosis superiores a los 100 mg al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales, la seguridad fetal de las dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

### **Precauciones**

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento. No tomar de forma continuada.

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

### **Interacciones**

La vitamina C a dosis, puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

## Advertencia

Si está utilizando este medicamento, las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas, pueden dar resultados erróneos, lo que deberá ser tenido en cuenta por los pacientes diabéticos.

## Advertencia sobre excipientes

Este medicamento por contener 312 mg de sodio por comprimido efervescente puede ser perjudicial en pacientes con dietas pobres en sodio.

Este medicamento contiene como excipiente Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada comprimido efervescente del mismo contiene 11,2 mg de fenilalanina.

## Embarazo y lactancia:

### Importante para la mujer

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

No deben tomarse dosis altas en el embarazo. (Ver apartado de Contraindicaciones)

**Uso en niños:** Consulte a su médico.

**Efectos sobre la capacidad de conducción:** No se han descrito.

## Posología

Como norma general se tomará un comprimido una vez al día.

## Instrucciones para la correcta administración del preparado

Déjese disolver el comprimido efervescente en un vaso de agua y se obtendrá una bebida de agradable sabor a limón. Nunca se tomará el comprimido directamente, sin disolverlo.

## Sobredosis

En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda al médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

## Reacciones adversas

Las dosis superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales.

Asimismo existe el riesgo de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos. Si se observa cualquier reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## Conservación

Cerrar bien el tubo y conservar en lugar fresco y seco.

## Caducidad

Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

## Otras presentaciones

Envase de 15 comprimidos efervescentes, con 1.000 mg de vitamina C Sabor a naranja (Redoxon 1.000 mg Efervescente Sabor Naranja). Envase con dos tubos de 15 comprimidos efervescentes de 1.000 mg con sabor a naranja. Envase con 20 comprimidos masticables, con 500 mg de vitamina C (Redoxon 500 mg masticable). Envase con 20 ml de solución gotas (1 ml = 200 mg de vitamina C) (Redoxon gotas).

## Texto revisado

Octubre 1995

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Bayer